

トリプルネガティブ乳がん(術前化学療法)

**Pemb+EC療法** 3週毎

Pemb+CBDCA+PTX後の2nd NACとして最大4course

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
ペムブロリズマブ Pemb	キイトルーダ	200 mg/body	d1
エピルビシン EPI	エピルビシン	90 mg/m <sup>2</sup>	d1
シクロホスファミド CPA	エドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	d1

d1	アプレピタント(125) 1CP EPI投与1時間～1時間30分前に内服
d2-3	アプレピタント(80) 1CP 朝食後内服
	デキサメタゾン錠(4mg) 2T 2×朝昼食後
d4	デキサメタゾン錠(4mg) 2T 2×朝昼食後

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y② **ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min**  
0.2～5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用

Y③ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用  
Y字から投与、バックアダプタ使用

④ パロノセトロン(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V  
+ 生理食塩液 50ml / 15min

Y⑤ **エピルビシン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min**

Y⑥ **シクロホスファミド ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min**

Day2

**ペグフィルグラスチム(3.6mg) 1シリンジ / 皮下注**

エピルビシン累積投与量 (900mg/m<sup>2</sup>まで)

投与日	投与量	累積投与量	投与日	投与量	累積投与量