

トリプルネガティブ乳がん(術前化学療法)

Pemb+CBDCA(AUC=1.5)+PTX療法 3週毎
(1st NACとして最大4course)

| 薬剤・略号 | 商品名 | 投与量 | 投与日 |
|------------------|--------|---------------------|-----------|
| ペムブロリズマブ Pemb | キイトルーダ | 200mg/body | d1 |
| パクリタキセル PTX | | 80mg/m ² | d1,d8,d15 |
| カルボプラチン CBDCA | | AUC=1.5 | d1,d8,d15 |

※CBDCAはAUC=1.5であればweekly、AUC=5であればtriweeklyで投与
 Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

| | |
|--------|----------------|
| d2-4 | |
| d9-11 | デキサメタゾン錠4mg 1錠 |
| d16-18 | |

※上記内服薬は必要に応じて使用を考慮する。

| Day1 | | |
|--|---|--|
| ① | 生理食塩液 100ml / ルートキープ | |
| Y② | <table border="1"> <tr> <td>ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min</td> </tr> </table> 0.2~5 μm以下のインラインフィルター付ルートを使用 | ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min |
| ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min | | |
| Y③ | 生食 100ml / フラッシュ用 Y字から投与バックアダプタ使用 | |
| ④ | グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min | |
| Y⑤ | <table border="1"> <tr> <td>パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min</td> </tr> </table> インラインフィルター付ルート使用 | パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min |
| パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min | | |
| Y⑥ | <table border="1"> <tr> <td>カルボプラチン ()mg/body + 生食250ml / 60min</td> </tr> </table> | カルボプラチン ()mg/body + 生食250ml / 60min |
| カルボプラチン ()mg/body + 生食250ml / 60min | | |

| Day8、15 | | |
|--|---|--|
| ① | 生理食塩液 100ml / ルートキープ | |
| ② | グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min | |
| Y③ | <table border="1"> <tr> <td>パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min</td> </tr> </table> インラインフィルター付ルート使用 | パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min |
| パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min | | |
| Y④ | <table border="1"> <tr> <td>カルボプラチン ()mg/body + 生理食塩液250ml / 60min</td> </tr> </table> | カルボプラチン ()mg/body + 生理食塩液250ml / 60min |
| カルボプラチン ()mg/body + 生理食塩液250ml / 60min | | |