

トリプルネガティブ乳がん(術前化学療法)

Pemb+CBDCA(AUC=5)+PTX療法

3週毎

(1st NACとして最大4course)

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ペムプロリズマブ	Pemb	キイトルーダ	200mg/body	d1
パクリタキセル	PTX		80mg/m2	d1,d8,d15
カルボプラチン	CBDCA		AUC=5	d1

※CBDCAはAUC=1.5であればweekly、AUC=5であればtriweeklyで投与

Cr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Cr + 25)

d1,d8,d15	アプレピタントカプセル(125) 1カプセル CBDCA投与1時間～1時間30分前に内服
d2-3	アプレピタントカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服
d9-10	デキサメタゾン錠4mg 1錠
d16-17	
d4,d11,d18	デキサメタゾン錠4mg 1錠

※上記内服薬は必要に応じて使用を考慮する。

Day1	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
Y②	ペムプロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min 0.2～5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用
Y③	生食 100ml / フラッシュ用 Y字から投与バックアダプタ使用
④	パロノセトロン(0.75mg) 1V + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min
Y⑤	パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min インラインフィルター付ルート使用
Y⑥	カルボプラチン ()mg/body + 生理食塩液250ml / 60min

Day8、15	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
②	グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min
Y③	パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min インラインフィルター付ルート使用