

# 乳がん

## PER+Eribulin+3w-HER療法

3週毎

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
エリブリン	ハラヴェン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	Day1,8
トラスツズマブ	HER	初回;8mg/kg 2回目以降;6mg/kg	Day1
ペルツズマブ	PER	初回;840mg/body 2回目以降;420mg/body	Day1

### Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y ② ペルツズマブ 初回;840mg、2回目以降;420mg/body  
+ 生理食塩液 250ml / ※1

経過観察 / ※2

Y ③ トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)  
トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min  
(2回目以降)※3

Y ④ 生理食塩液 50ml / 5min (フラッシュ)  
Y字から投与, バッグアダプタ使用

Y ⑤ エリブリン ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 全開(5分以下で)

⑥ 生理食塩液 50ml / 5min (フラッシュ)

### Day8

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y ② エリブリン ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 全開(5分以下で)

③ 生理食塩液 50ml / 5min (フラッシュ)

※1 初回は60分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

※2 パージェタの投与時間と同じ時間、経過観察。

※3 初回は90分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間100mlで投与可。