

# 悪性神経膠腫(がん性髄膜炎)

## ベバシズマブ+MTX髄注

2週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
メトレキサート	MTX	メトレキサート	10 mg/body	Day1
ベバシズマブ		アバステン	10 mg/kg	Day1

ガスターD錠(20mg) 1錠 / 寝る前内服

Day1

デカドロン錠(0.5mg) 8錠

ガスターD錠(20mg) 1錠

ゾフランザイデイス錠(4mg) 1錠 / 起床後内服

ロイコボリン錠(5mg) 1回2錠 × 4回 / MTX髄注後 6時間毎に内服

入院

Day1

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

デキサート(6.6mg/2ml)1V / 髄注

メトレキサート 10mg + 注射用蒸留水 4ml / 髄注

※ 5mlのシリンジを使用して調製

生理食塩液 3ml / フラッシュ・髄注

生理食塩液 100ml / ルートキープ

ベバシズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / ※

外来

Day1

デキサート(6.6mg/2ml)1V / 髄注

メトレキサート 10mg + 注射用蒸留水 4ml / 髄注

※ 5mlのシリンジを使用して調製

生理食塩液 3ml / フラッシュ・髄注

生理食塩液 100ml / ルートキープ

ベバシズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / ※

※ベバシズマブ(アバステン)の投与時間は初回は90分で行い、以後特に問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分で投与できる。