

**BEP療法** 3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
エトポシド	VP-16	100 mg/m <sup>2</sup>	Day1~5
シスプラチン	CDDP	20 mg/m <sup>2</sup>	Day1~5
ブレオマイシン	BLM	30 mg/body	Day1,8,15

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル シスプラチン投与1時間前に内服  
 Day2~5 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

① ラクテックD 500ml + メイロン(7%20ml) 1A  
 + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 2hr

② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V  
 + 生理食塩液 100ml / 30min

生理食塩液 100ml / シングルルートプライミング用

S ③ **ブレオマイシン 30mg + 生理食塩液 500ml / 24hr持続**  
 シングルルート使用

Y ④ **シスプラチン ( )mg + 生理食塩液 500ml / 2hr**

Y ⑤ **エトポシド ( )mg + 生理食塩液 500ml / 2hr**

⑥ ソルデム3A 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 1A / 2hr

⑦ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 6hr (~24時)

Day2~5

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (0時~5時)

ソルデム3A 500ml / 5hr (5時~10時)

① ラクテックD 500ml + メイロン(7%20ml) 1A  
 + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 2hr

② デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ **シスプラチン ( )mg + 生理食塩液 500ml / 2hr**

Y ④ **エトポシド ( )mg + 生理食塩液 500ml / 2hr**

⑤ ソルデム3A 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 1A / 2hr

⑥ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 6hr (~24時)

生理食塩液 100ml / シングルルートフラッシュ用(ブレオ終了後・day2のみ)

## Day6

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (0時~5時)

ソルデム3A 500ml / 5hr (5時~10時)

ラクテックD 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (10時~13時)

ソルデム3A 500ml / 3hr (13時~16時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (16時~19時)

(ヘパロック)

## Day7

ラクテックD 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (7時~12時)

ソルデム3A 500ml / 5hr (12時~17時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (17時~22時)

(ヘパロック)

## Day8,15

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ ブレオマイシン 30mg + 生理食塩液 500ml / 24hr