

尿路上皮癌(膀胱癌、腎盂尿管癌)

GC療法

1kur=4週

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	Day1,8,15
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m ²	Day2

腎機能 CCr<60 : 70%用量

Day2 | イメンドカプセル(125) 1カプセル シスプラチン投与1時間前に内服

Day3,4 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

① ラクテックD 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr

Y ②

ゲムシタビン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

副作用増強の恐れがあるため60分以内で投与

③ ソルデム3A 500ml / 3hr

Day2

① ラクテックD 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 2hr

② ソルデム3A 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 2hr

③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

Y ④

シスプラチン ()mg + 生理食塩液 350ml / 3hr

⑤ ソルデム3A 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 1A / 3hr

⑥ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 4hr

Day3

ラクテックD 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (0時~5時)

ソルデム3A 500ml / 5hr (5時~10時)

ラクテックD 500ml / 3hr (10時~13時)

生理食塩液 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (13時~16時)

ラクテックD 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr (16時~19時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (19時~22時)

ソルデム3A 500ml / 6hr (22時~翌4時)

Day4

ラクテックD 500ml / 6hr (4時～10時)

生理食塩液 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (10時～13時)

ラクテックD 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr (13時～16時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (16時～19時)

ソルデム3A 500ml / 3hr (19時～22時)

(ヘパロック)

Day5

ラクテックD 500ml / 3hr (10時～13時)

ソルデム3A 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr (13時～16時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 3hr (16時～19時)

(ヘパロック)

Day6

ラクテックD 500ml / 3hr (10時～13時)

ソルデム3A 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr (13時～16時)

Day8・15

①ラクテックD 500ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 3hr

Y ②

ゲムシタピン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

副作用増強の恐れがあるため60分以内で投与

③ソルデム3A 500ml / 3hr

Day9・16

ソルデム3A 500ml / 3hr (10時～13時)

ソルデム3A 500ml / 3hr (13時～16時)

参考) 開始基準

	白血球数	好中球数	血小板数
day1	3000/ μ l以上	1500/ μ l以上	10万/ μ l以上
day8,15	2000/ μ l以上	1000/ μ l以上	7万/ μ l以上